

UROGRAFIA - przygotowanie do badania

Dwa dni poprzedzające badanie:

- dieta lekkostrawna z ograniczeniem cukru i pokarmów wzdymających (kapusta, kalafior itp..). **PIĆ NORMALNIE !**

W dniu poprzedzającym badanie:

- **badanie rano:** około godziny 13:00 - co najmniej 2 łyżki oleju rycynowego lub soli gorzkiej, ewentualnie 2 tabletki BISACODYLU (środki przeczyszczające) - jeżeli nie ma skutku powtórzyć według własnego doświadczenia.

Po skutecznym przeczyszczeniu ESPUMISAN - według ulotki lub 3 x 1-2 tabletki. Do czasu badania nie jeść i nie pić . Jeśli to możliwe nie przyjmować żadnych leków.

Zgłosić się do pracowni RTG na wyznaczoną godzinę ze skierowaniem, wszystkimi poprzednimi zdjęciami RTG i USG. Jeśli Pacjent nie może się zgłosić do badania - uprzejmie prosimy o odwołanie badania co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem.

WYNIK BADANIA ZELEŻY OD WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA !

WLEW DOODBYTNICZY - przygotowanie do badania

Dwa dni poprzedzające badanie:

- ograniczyć spożywanie pokarmów. Pić dużo niegazowanej wody mineralnej.

W dniu poprzedzającym badanie:

- nic nie jeść. Wypić płyn przeczyszczający (FORTRANS lub X-PREP).

FORTRANS - lek do kupienia w aptece na receptę(1 opakowanie zawiera 4 torebki) - do przygotowania użyć 3 torebki.

Każdą torebkę FORTRANSU rozpuścić w 1 litrze wody przegotowanej.

W przeddzień badania zjeść śniadanie o godzinie 8:00. Pić od godziny 11:00 1 szklanekę roztworu co 1 godzinę. Po wypiciu 4 szklanek wypić 1 litr wody mineralnej niegazowanej (pić w takim samym okresie czasu - odstęp między torebkami ok. 4 godziny). Czynność powtórzyć aż do skończenia zalecanej ilości FORTRANSU. Od tego czasu nic nie jeść. W dniu badania pić tylko wodę mineralną niegazowaną i wykonać lewatywę. Istnieje możliwość wykonania lewatywy w gabinecie RTG.

X-PREP - lek do kupienia w aptece (bez recepty). Wypić gotowy roztwór w przeddzień badania około południa i do wieczora wypić 3 litry wody mineralnej niegazowanej. Jeżeli Pacjent waży więcej niż 80kg należy wypić zawartość dwóch opakowań X-PREPU. W dniu badania rano wykonać lewatywę (można użyć gotowej lewatywy do kupienia w aptece bez recepty pod nazwą ENEMA, ewentualnie użyć ok. 1,5 litra ciepłej wody z niewielką ilością mydła. Istnieje możliwość wykonania lewatywy w gabinecie RTG. **UWAGA! - X-PREP nie należy stosować przy cukrzycy.**

Zgłosić się do pracowni RTG na wyznaczoną godzinę ze skierowaniem, wszystkimi poprzednimi zdjęciami RTG i USG. Przynieść ze sobą irygator, prześcieradło lub duży ręcznik.

WYNIK BADANIA ZELEŻY OD WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA !